

- **Wat voor ziekte of plaag is het?**

Plaag: Mijten (witte bonemijt – *Tarsonemus*)

- **Hoe zou je deze kunnen herkennen?**

Gekrulde versmalde bladeren (meestal jonge bladeren worden aangetast)



Mijten schade op Antoerwa plant

- **Wat voor schade richten deze?**

Ze zuigen de plantesappen en injecteren gifstoffen, waardoor de bladeren misvormen. Hierdoor vindt er groeistagnatie plaats met als gevolg productie vermindering.

LVV



AgroTIP

● Wat zou je het best kunnen gebruiken om het te bestrijden/beheersen

Biologisch:

- Gedurende droge dagen gehele plant goed natmaken
- Bij hevige aantasting bespuiten met Abamectin (handelsnaam: Cure, Abalotin) met een dosering van 0.5 cc/ liter water (bespuiten in vroege ochtend of laat in de middag).
Kan wel tijdens oogst bespoten worden veiligheidstermijn is 1 dag.

Chemisch (bespuiten in vroege ochtend of laat in de middag):

- Fenbutatin oxide (handelsnaam: Torque of Turque) met een dosering van 0.5 cc/ liter water
(NIET tijdens de oogst bespuiten veiligheidstermijn is 10 dagen)
- Diafenthiuron (handelsnaam: Pegasus of Pegasun) met een dosering van 1 cc/ liter water
(NIET tijdens de oogst bespuiten veiligheidstermijn is 10 dagen)
- Chlorfenapyr (handelsnaam: Pirate) met een dosering van 1.25 cc/ liter water
(NIET tijdens de oogst bespuiten veiligheidstermijn is 10 dagen).

**Let wel: Graag altijd afwisselend gebruik maken van chemische - als biologische middelen
vb. eerst keer wordt bespoten met Fenbutatin oxide, dan moet tweede keer bespoten worden met Diafenthiuron of Chlorfenapyr.**

● Wat zou je kunnen doen ter voorkoming?

- De planten altijd goed verzorgen (rondom je aanplant altijd netjes houden),
- Gewas rotatie (afwisselend gewassen telen),
- Men kan niet altijd voorkomen, maar wel beheersen.

